

BILANS AVANT EXPORT

Certains pays acceptent la méthode PCR comme alternative, tandis que d'autres exigent une sérologie par ELISA en remplacement. Nous vous recommandons de vous rapprocher de l'ambassade du pays de destination

si cette analyse fait partie des exigences pour l'entrée de l'animal sur le territoire.

Tarifs 2025

<u> </u>		
RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES		Code de la clinique* - OBLIGATOIRE
Nom propriétaire :		cv
Adresse propriétaire :		
Adresse mail :	Téléphone :	Cachet de la clinique
		1111
Nom de patient : F FS M MC	J J M M A A	
	te de naissance :	
N° de tatouage / Puce :		Dr : *Disponible sur votre esplace MyAnydiag
Pays de destination :		
J J M M ,	A A A	Transport des analyses Dépôt laboratoire INOVIE
Date de prise de sang et de lecture de la puce :		Ramassage par coursier INOVIE
Nombre et nature des échantillons - OBLIGATOIRE	Règlement	☐ Chronopost☐ Enlèvement sur demande Chronopost☐
Sang total EDTA :	☐ Facturation mensuelle à la clinique	En ligne sur votre espace MyAnydiag Coursier Paris et limitrophe
Sérum :	Règlement joint Paiement en ligne	Course urgente Paris et limitrophe
	Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlem	Autre type d'envoi / Dépôt au laboratoire
	SÉROLOGIE RAGE	
RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES		□ Demande de sérologie rage
Nom du vaccin :		
Numéro de lot :		Date et signature du vétérinaire
J J M M A A A A □ Primovaco	cin □ Rappel	
Date de vaccination : Primovaco	н Коррес	
		
INSTRUCTIONS POUR LA RÉALISATION D'UNE SÉROLO	OGIE RAGE	incwalve
INSTRUCTIONS POUR LA RÉALISATION D'UNE SÉROLO	OGIE RAGE	inovalys
Réglementation : • Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la _l	orise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays
Réglementation :	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la _l npératif de vous informer auprès de l'an	orise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays
Réglementation : • Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum :	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la _l npératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences.	orise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays
Réglementation: • Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: • Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la _l npératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. t ces consignes :	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nbassade du pays concerné avant d'entamer les
Réglementation: • Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: • Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec.	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la npératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. t ces consignes : quelques heures à température ambian	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nbassade du pays concerné avant d'entamer les te, centrifugation, séparation et transfert du sérum
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la npératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. t ces consignes : quelques heures à température ambian	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nbassade du pays concerné avant d'entamer les te, centrifugation, séparation et transfert du sérum
Réglementation: • Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: • Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec.	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la npératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. t ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'anir	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nbassade du pays concerné avant d'entamer les te, centrifugation, séparation et transfert du sérum
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport:	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la npératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. t ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'anir	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nbassade du pays concerné avant d'entamer les te, centrifugation, séparation et transfert du sérum
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an en-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'aniresation de l'analyse.	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nbassade du pays concerné avant d'entamer les te, centrifugation, séparation et transfert du sérum
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante.	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an en-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'anir sation de l'analyse.	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nbassade du pays concerné avant d'entamer les te, centrifugation, séparation et transfert du sérum nal.
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation:	ele et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. t ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'aniresation de l'analyse. de au plus tard 15 jours après la prise de sar	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays inbassade du pays concerné avant d'entamer les te, centrifugation, séparation et transfert du sérum nal.
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation: Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES	ele et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. t ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'aniresation de l'analyse. de au plus tard 15 jours après la prise de sar	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays inbassade du pays concerné avant d'entamer les te, centrifugation, séparation et transfert du sérum nal.
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation: Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES Résultats: Délai d'environ 10 jours ouvrés.	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'aniresation de l'analyse. LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES REN	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays abassade du pays concerné avant d'entamer les et, centrifugation, séparation et transfert du sérum mal.
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation: Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES Résultats:	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'aniresation de l'analyse. LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES REN	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays abassade du pays concerné avant d'entamer les et, centrifugation, séparation et transfert du sérum mal.
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation: Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES Résultats: Délai d'environ 10 jours ouvrés.	ale et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'anire sation de l'analyse. LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES REN sultat de titrage d'anticorps supérieur à	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays n'entres du pays concerné avant d'entamer les te, centrifugation, séparation et transfert du sérum nal. Ig, afin de prévenir une diminution du titre en anticorps. USEIGNEES. 0,5 UI/mL avant son départ.
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation: Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES Résultats: Délai d'environ 10 jours ouvrés. Rappel: Pour être autorisé à voyager, l'animal doit présenter un ré	ele et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambiant en nom du propriétaire et le nom de l'anires ation de l'analyse. LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES REN SULTATIONS SULTATIONS SULTATIONS SUPPLÉMENT	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays n'entre du pays concerné avant d'entamer les et, centrifugation, séparation et transfert du sérum nal. Ing, afin de prévenir une diminution du titre en anticorps. USEIGNEES. O,5 UI/mL avant son départ.
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation: Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES Résultats: Délai d'environ 10 jours ouvrés. Rappel: Pour être autorisé à voyager, l'animal doit présenter un ré AUTRES ANALYSES AVANT DÉPART À L' Babesia gibsoni coloration Blood Smear	ele et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'aniresation de l'analyse. LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES REN SULTAT de titrage d'anticorps supérieur à ÉTRANGER - FRAIS SUPPLÉMENT	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays n'entre du pays concerné avant d'entamer les et, centrifugation, séparation et transfert du sérum nal. Ing., afin de prévenir une diminution du titre en anticorps. ISEIGNEES. O,5 UI/mL avant son départ. TAIRES DE DOSSIER À AJOUTER POUR CHAQUE ANALYSE Igutination (RSAT)
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccinate de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation: Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES Résultats: Délai d'environ 10 jours ouvrés. Rappel: Pour être autorisé à voyager, l'animal doit présenter un ré AUTRES ANALYSES AVANT DÉPART À L' Babesia canis coloration Blood Smear Babesia canis / gibsoni () ELISA	ele et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambiant en nom du propriétaire et le nom de l'anires ation de l'analyse. LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES REN Sultat de titrage d'anticorps supérieur à ÉTRANGER - FRAIS SUPPLÉMENT Brucella canis Ag Dirofilaria immit	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nabassade du pays concerné avant d'entamer les et, centrifugation, séparation et transfert du sérum nal. Ing, afin de prévenir une diminution du titre en anticorps. USEIGNEES. O,5 UI/mL avant son départ. TAIRES DE DOSSIER À AJOUTER POUR CHAQUE ANALYSE glutination (RSAT)
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation: Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES Résultats: Délai d'environ 10 jours ouvrés. Rappel: Pour être autorisé à voyager, l'animal doit présenter un ré AUTRES ANALYSES AVANT DÉPART À L' Babesia canis coloration Blood Smear Babesia canis / gibsoni () ELISA Babesia sp. PCR	ele et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'anires sation de l'analyse. LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES REN Sultat de titrage d'anticorps supérieur à ÉTRANGER - FRAIS SUPPLÉMENT Brucella canis Ag Dirofilaria immit	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nabassade du pays concerné avant d'entamer les et, centrifugation, séparation et transfert du sérum nal. Ing. afin de prévenir une diminution du titre en anticorps. ISEIGNEES. O,5 UI/mL avant son départ. TAIRES DE DOSSIER À AJOUTER POUR CHAQUE ANALYSE glutination (RSAT) Sis ELISA Sis Microfiltration
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation: Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES Résultats: Délai d'environ 10 jours ouvrés. Rappel: Pour être autorisé à voyager, l'animal doit présenter un ré AUTRES ANALYSES AVANT DÉPART À L' Babesia canis coloration Blood Smear Babesia gibsoni coloration Blood Smear Babesia canis / gibsoni ① ELISA Babesia sp. PCR Précisez si la demande concerne B. canis, B. gibsoni ou les 2 (le tarif reste identique):	ele et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambiant et nom du propriétaire et le nom de l'anires sation de l'analyse. LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES REN Sultat de titrage d'anticorps supérieur à ÉTRANGER - FRAIS SUPPLÉMENT Brucella canis Ag Dirofilaria immit Dirofilaria immit Ehrlichia canis In	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nabassade du pays concerné avant d'entamer les et, centrifugation, séparation et transfert du sérum nal. Ing, afin de prévenir une diminution du titre en anticorps. ISEIGNEES. O,5 UI/mL avant son départ. ISEIGNEES DE DOSSIER À AJOUTER POUR CHAQUE ANALYSE glutination (RSAT) Sis ELISA Gircofiltration Girect Immunofluorescence (IFI)
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation: Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES Résultats: Délai d'environ 10 jours ouvrés. Rappel: Pour être autorisé à voyager, l'animal doit présenter un ré AUTRES ANALYSES AVANT DÉPART À L' Babesia canis coloration Blood Smear Babesia gibsoni Coloration Blood Smear Babesia canis / gibsoni ① ELISA Babesia sp. PCR Précisez si la demande concerne B. canis, B. gibsoni ou les 2 (le tarif reste identique): Babesia canis Babesia gibsoni	ele et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'anire sation de l'analyse. LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES REN Sultat de titrage d'anticorps supérieur à ÉTRANGER - FRAIS SUPPLÉMENT Brucella canis Ag Dirofilaria immite Dirofilaria immite Leishmania infa	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nabassade du pays concerné avant d'entamer les te, centrifugation, séparation et transfert du sérum nal. Ing. afin de prévenir une diminution du titre en anticorps. ISEIGNEES. O,5 UI/mL avant son départ. IAIRES DE DOSSIER À AJOUTER POUR CHAQUE ANALYSE Igutination (RSAT) Sis elisa Cis Microfiltration Girect Immunofluorescence (IFI)
Réglementation: Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccina de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est in démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de no Préparation du sérum: Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectan Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant dans un nouveau tube sec. Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le Conservation au réfrigérateur. ATTENTION: Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalis Transport: Le transport doit se faire à température ambiante. Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis ATTENTION: Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire Documentation: Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES Résultats: Délai d'environ 10 jours ouvrés. Rappel: Pour être autorisé à voyager, l'animal doit présenter un ré AUTRES ANALYSES AVANT DÉPART À L' Babesia canis Coloration Blood Smear Babesia gibsoni Coloration Blood Smear Babesia canis / gibsoni ① ELISA Babesia sp. PCR Précisez si la demande concerne B. canis, B. gibsoni ou les 2 (le tarif reste identique):	ele et la prise de sang, ainsi qu'entre la prératif de vous informer auprès de l'an in-conformité à ces exigences. It ces consignes : quelques heures à température ambian e nom du propriétaire et le nom de l'anire sation de l'analyse. LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES REN Sultat de titrage d'anticorps supérieur à l'anire de titrage d'anticorps supérieur à l'anire de l'anire d'anire de l'analyse. ÉTRANGER - FRAIS SUPPLÉMENT Brucella canis Ag Dirofilaria immit l'a Dirofilaria immit l'a Leishmania infa	prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays nabassade du pays concerné avant d'entamer les et, centrifugation, séparation et transfert du sérum nal. Ing, afin de prévenir une diminution du titre en anticorps. ISEIGNEES. O,5 UI/mL avant son départ. ISEIGNEES DE DOSSIER À AJOUTER POUR CHAQUE ANALYSE glutination (RSAT) Sis ELISA Gircofiltration Girect Immunofluorescence (IFI)

☐ *Trypanosoma evansis* Agglutination (RSAT)

☐ *Trypanosoma evansis* Coloration Blood Smear

E